

آذین ناپایدار قلبی



واحد آموزش سلامت

تاریخ تدوین: بهار ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۳



پیارسان اقامه مهیس (رد) کلیر

- ضربان قلب شما خیلی کند (کمتر از ۶۰ بار در دقیقه) یا خیلی سریع (بیش از ۱۲۰ بار در دقیقه) شده است یا ریتم ثابتی ندارد.
- برای مصرف داروهای قلبی خود مشکل دارید.
- عالم غیر طبیعی جدیدی مشاهده کرده اید.
- اگر فکر می کنید که به حمله قلبی دچار شده اید فوراً با مرکز خدمات پزشکی تماس بگیرید.

راههای پیشگیری:

تغییر سبک زندگی می تواند از بروز حملات قلبی و عالم آذین چلوگیری کند. تغییراتی که ممکن است توسط پزشک مراقبت های ویژه به شما توصیه می شود، عبارت است از :



- کاهش وزن در صورتی که دچار اضافه وزن باشد.
- ترک سیگار
- ورزش کردن به طور منظم
- عدم مصرف الکل
- داشتن یک رژیم غذایی سالم که غنی از سبزیجات، میوه ها، غلات کامل، ماهی و کوشت مرغ باشد.
- کنترل بیماری های دیگر از قبیل فشارخون بالا، دیابت و مقدار بالای کلسترول خون

اگر می دانید که در معرض یک یا چند مورد از عوامل خطرناک برای بیماری های قلبی هستید، با پزشک خود در مورد مصرف آسپرین یا داروهای دیگری که به چلوگیری از حمله های قلبی کمک می کنند مشورت کنید

ممکن است برای برخی از افراد از عمل بای پس قلب استفاده شود. استفاده از این عمل به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از آن ها عبارت است از :

- کدام سرخرگ ها مسدود شده است؟
- چه تعداد از سرخرگ ها دچار گرفتگی شده اند؟
- چه قسمت هایی از سرخرگ های کرونری تنگ شده است؟
- شدت گرفتگی یا تنگ شدن سرخرگ در چه حد است؟

عوارض احتمالی

آنژین قلبی نایابدار می تواند منجر به عوارض زیر شود :

- اریتمی
- حمله قلبی
- نارسایی قلبی

زمان مراجعه به مرکز پزشکی

هر کاه در تابعیه قفسه سینه، دردیها فشار جدید و غیرمنتظره ای احساس کردید بلافضله به یک مرکز پزشکی مراجعه کنید. اگر قبل از آنژین داشته اید باید پزشک معالج خود تماس بگیرید.

اگر درد ناشی از آنژین شرایط زیر را داشته باشد بلافضله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید :

- با کنخت ۵ دقیقه از مصرف قرص میکروکلیسیرین، درد ساکن نمی شود (ممکن است پزشک به شما گفته باشد که از دوز سه برابر استفاده کنید).
- با مصرف دوز سه برابر نیتروکلیسیرین، درد برطرف نمی شود.
- مرتبای در حال بدتر شدن است.
- ایندا با مصرف نیتروکلیسیرین تسکین پیدا کرده، اما بررسی کردد.

در شرایط زیر با پزشک مراقبت های ویژه خود تماس بگیرید :

- عالم آنژین به طور مرتب در شما بروز می کند.
- وقتی نشسته اید دچار آنژین می شوید (آنژین در حال استراحت).
- به طور مرتب احساس خستگی می کنید.
- احساس ضعف یا سرگیجه شدید دارید یا در اثر ضعف غش می کنید.

آنژین قلبی نایابیدار

آنژین قلبی نایابیدار عامل بروز درد غیرمنتظره ای در ناحیه قفسه سینه است که معمولاً در هنکام استراحت یا با حداقل فعالیت ایجاد شده و بیش از ۲۰ دقیقه طول می کشد و با استراحت یا مصرف نیتروگلیسیرین یا مسکن رفع نمی شود. درد ممکن است بیمار را از خواب بیدار گند یا دردی که اخیراً شروع شده است. درد قفسه سینه که نسبت به دردهای قلبی شدت یا فرکاتس بیشتری داشته یا در سطح فعالیت کمتری ایجاد شده و یا مدت زمان بیشتری طول بکشد.

علت: شایعترین علت آنژین قلبی، کاهش جریان خون به عضله قلب به دلیل تنگ و باریک شدن سرخرگ‌های کرونری در اثر تشکیل لخته‌های چربی می‌باشد. درنتیجه این بیماری ممکن است رگ‌های خونی پاره شده و به سرخرگ‌های کرونری آسیبی دارد شود که منجر به تشکیل لخته خون و مسدود کردن جریان خون به عضله قلب می‌شود.

- برخی از علت‌های نادر آنژین عمارت است از:
 - عملکرد غیر طبیعی مویرک‌های ریز بدون تنگ شدن سرخرگ‌های بزرگتر
 - اسپاسم سرخرگ‌های کرونری

عوامل خطرزا:

دیابت

- سابقه خاتوادگی در بروز زود هنکام بیماری‌های قلبی کرونری (برای مثال یکی از بستکان نزدیک مانند خواهر و برادر یا والدین، قبل از سن ۵۵ سالگی در مردان یا ۶۵ سالگی در زنان دچار بیماری قلبی شده باشد)

- نشار خون بالا
- بالا بودن کلسترول ال دی ال
- پایین بودن کلسترول اچ دی ال
- جنسيت مذکور

درمان:

ممکن است لازم باشد که برای یک دوره کوتاه بستره، انجام آزمایش‌های بیشتر (اکو، توارقب، آنژیوگرافی و ...) و جلوگیری از بروز عوارض بعدی به یک بیمارستان مراجعه کنید.

از داروهای رقیق کننده خون برای درمان آنژین نایابیدار و جلوگیری از بروز آن استفاده می‌شود. اگر می‌توانید بدون هیچ خطری از این داروها مصرف کنید، در اسرع وقت این دارو برای شما تجویز می‌شود. داروهایی از قبیل آسپرین و داروی تجویزی کلوبیدوکول یا مشابه‌های آن مصرف این داروها میتواند باعث کاهش احتمال حمله قلبی و یا کاهش شدت حمله هایی که اتفاق می‌افتد، شود.

هنگامی که یک آنژین قلبی نایابیدار اتفاق افتد:

- ممکن است برای شما داروی همارین (یا یک داروی دیگر رقیق کننده خون) و نیتروگلیسیرین (قرص‌های زیرزبانی یا از طریق (IV) تجویز شود).
- سایر درمان‌هایی که ممکن است برای شما در نظر گرفته شود شامل داروهایی برای کنترل فشار خون، اضطراب، آریتمی و کلسترول (مانند داروی استاتین) می‌باشد.
- برای باز کردن سرخرگ‌های کشیده یا مسدود شده ممکن است از عملی به نام آنژیوپلاستی و استنت کلاری، استفاده شود.
- آنژیوپلاستی عملی است که برای باز کردن رگ‌های تنک شده یا مسدود شده‌ای که مسئول خون‌رسانی به قلب هستند، انجام می‌گیرد.
- استنت سرخرگ کرونری، یک لوله فلزی توری و کوچک است که در داخل سرخرگ کرونری قرار می‌گیرد و آن را باز می‌کند. غالباً عمل استنت کلاری بعد از آنژیوپلاستی انجام می‌شود. این عمل باعث جلوگیری از مسدود شدن مجدد سرخرگ می‌شود. نوع استنت‌های آغازته به دارو، استنت هایی هستند که در داخل خود داروی داروهایی دارند که مانع از مسدود شدن سرخرگ با گذشت زمان می‌شود.



زنگی بدون تحرک عدم فعالیت ورزشی

- زنگی
- چاقی
- سن بالا
- سیگار

علام و نشانه‌ها

- مهم ترین علام آنژین قلبی عبارت است از:
- درد قفسه سینه که ممکن است در ناحیه شانه، ارواره، گردن، کمر یا سایر قسمت های نزدیک احساس شود.
 - نازاحتی هایی از قبیل احساس فشرده‌گی، سوزش قلب، کوبش یا تیر کشیدن قفسه سینه.
 - نازاحتی هایی که معمولاً در هنکام استراحت اتفاق می‌افتد و با مصرف دارو به راحتی برطرف نمی‌شود.
 - تنکی نفس
 - تعزیر زیاد

در صورت ابتلاء به آنژین پاییدار، درد قفسه سینه یا سایر علام آن فقط در صورتی که میزان معینی از فعالیت فیزیکی یا استرس داشته باشید، بروز می‌کند. بروز این نوع درد معمولاً به صورت گاه و بیگاه نیست و با گذشت زمان بر شدت آن افزوده نمی‌شود.

آنژین نایابیدار، دردی در قفسه سینه است که به صورت ناکهانی بروز می‌کند و اغلب بعد از یک دوره زمانی کوتاه، شدت آن بیشتر می‌شود. اگر درد قفسه سینه شما شرایط زیر را داشته باشد، ممکن است ناشی از آنژین نایابیدار باشد:

- قیلاً سابقه بروز آن وجود نداشته باشد، شدید باشد، گاه و بیگاه بروز کند و در شرایط فعالیت کم یا در هنکام استراحت احساس شود.

به مدت بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول بکشد.

- بدون دلیل بروز کند (برای مثال وقتی که خواب هستید یا آرام نشسته اید).
- به داروی خاصی به نام نیتروگلیسیرین پاسخ نمی‌دهد.
- هرراه با افت فشار خون یا تنکی نفس می‌باشد.

آنژین نایابیدار یک اعلان خطر جدی و علامت آن است که ممکن است به زودی دچار حمله قلبی شود. بیمار این باید فوراً درمان شود. پس اگر هر نوع دردی در ناحیه قفسه سینه احساس کردید، فوراً به پزشک مراجعت های اولیه مراجعه کنید.